

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

## 記

《変更日》 平成 29 年 4 月 1 日（土）受付分より  
（沖縄地区：平成 29 年 3 月 31 日（金）より）

## 《変更内容》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.25	0761	アセトアミノフェン	検査方法	EIA 法	酵素法
			有効 治療濃度	中毒域： 200.1 以上（4 時間） 100.1 以上（8 時間） 50.1 以上（12 時間） μg/mL	中毒域： 4 時間後：200.0 以上 12 時間後：50.0 以上 μg/mL
			最小 報告値	5.0 未満	10.0 以下
			備考	アセトアミノフェン、ピリナジン、ナパ	ピリナジン、カロナール、アンヒバ、アルピニー （高ビリルビン検体、溶血検体は避けてください）
P.34	2540	11-デオキシコルチゾール	所要日数	10 ～ 24 日	12 ～ 19 日

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.41	1185	IgG サブクラス分画	検体量	血清 0.5mL	血清 0.4mL
			検査方法	免疫比濁法 および ラテックス免疫比濁法	ネフェロメトリー法
			JLAC10	5A050-0000- 023-070-00	5A050-0000- 023-063-00
			基準値	IgG1 : 351~962 IgG2 : 239~838 IgG3 : 8.5~140 IgG4 : 4.5~117 mg/dL	IgG1 : 320~748 IgG2 : 208~754 IgG3 : 6.6~88.3 IgG4 : 4.8~105.0 mg/dL
			最小 報告値	IgG1 : 15.0 未満 IgG2 : 2.0 未満 IgG3 : 3.0 未満 IgG4 : 2.0 未満 % 0.01 未満	IgG1 : 7.0 以下 IgG2 : 8.0 以下 IgG3 : 5.0 以下 IgG4 : 3.0 以下 % 0.01 以下

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 委託先における変更