

先生各位

## 検査受託再開および変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび総合研究所で発生しました火災以降、受託を一時中断させていただいておりました添付一覧の項目について、受託の再開および検査内容の変更をさせていただきますのでご案内申し上げます。

ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

- 《受託再開日》 平成31年2月18日（月）受付分より
- 《再開項目》 添付一覧をご参照ください。
- 《注 意》 平成31年2月16日（土）受付以前の追加検査はお受けできませんので、予めご了承願います。

## 受託再開項目一覧

## ● 受託再開に伴う検査内容変更

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.2	0040	蛋白分画	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			所要日数	3～5日	1～3日
			基準値	Alb：62.0～72.0 α1：2.0～3.0 α2：5.0～9.0 β：7.0～11.0 γ：11.0～20.0 A/G比：1.60～2.60	Alb：60.2～71.4 α1：1.9～3.3 α2：5.7～9.7 β：6.9～10.7 γ：10.5～20.3 A/G比：1.5～2.5
			報告形態	A/G比：小数点第二位 分画パターンなし	A/G比：小数点第一位
P.29	2650	h-ANP (ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド)	所要日数	4～6日	2～4日
			基準値	43.0 pg/mL以下	43 pg/mL以下
			報告形態	小数点第一位	整数
			最小報告値	5.0 pg/mL未満	5 pg/mL以下
			最大報告値	2000.0 pg/mL以上	設定なし
P.36	2348	ペプシノゲン I・II	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			所要日数	3～4日	1～3日
			最小報告値	ペプシノゲン I：0.5 ng/mL未満 ペプシノゲン II：0.5 ng/mL未満	ペプシノゲン I：2.4 ng/mL以下 ペプシノゲン II：1.3 ng/mL以下
P.39	2626 負荷試験コード 2341～2346 3773～3775	レニン活性 (PRA)	検体量	血漿 0.3mL	血漿 0.7mL
			保存条件	必凍	凍結
			所要日数	5～7日	2～5日
			検査方法	RIA2抗体法	EIA法
			JLAC10	4Z010-0000-022-001-01	4Z010-0000-022-021-01
			基準値	臥位：0.3-2.9 立位：0.3-5.4 ng/mL/hr ※報告書への基準値表記は臥位のみ	臥位：0.2～2.3 座位：0.2～3.9 立位：0.2～4.1 ng/mL/hr ※報告書への基準値表記は臥位のみ
			最小報告値	0.1 ng/mL/hr以下	0.2 ng/mL/hr未満
			最大報告値	設定なし	45.0 ng/mL/hr以上
P.42	0975	IgE (非特異的IgE)	所要日数	4～6日	2～4日
			最小報告値	5.0 IU/mL以下	2 IU/mL以下
			報告形態	小数点第一位	整数
	—	特異的IgE CAPマルチアレルゲン	所要日数	4～6日	2～4日
			最小報告値	0.10 UA/mL未満	0.10 UA/mL以下
	—	特異的IgE CAPシングルアレルゲン	所要日数	4～6日	2～4日
			最小報告値	0.10 UA/mL未満	0.10 UA/mL以下
	0970	アトピー鑑別試験	所要日数	4～6日	2～4日
	9345	特異的IgE Ara h2 (ピーナッツ由来)	所要日数	4～6日	2～4日
			最小報告値	0.10 UA/mL未満	0.10 UA/mL以下
9877	特異的IgE Viewアレルギー-39	所要日数	4～5日	2～6日	

## ● 受託再開に伴う検査内容変更

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.48	1322	抗核抗体半定量 (ANA)	検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
			所要日数	4～6日	2～4日
			報告形態	2701：均質型 2702：斑紋型 2703：核小体型 2704：辺縁型 2705：セントロメア型 2706：細胞質型 1323：その他染色型 1 1324：その他染色型 2  ※検出された型の倍数(値)を報告	1323：パターン 1324：パターン  ※検出された型を報告
P.66	3937	ヘリコバクター・ピロリ抗体	検体量	血清 0.3mL	血清 0.6mL
			所要日数	3～4日	1～3日
			基準値	10 U/mL未満 (-)	10.0 U/mL未満 (-)
			報告形態	整数	小数点第一位
			最小報告値	3 U/mL未満	3.0 U/mL未満
			最大報告値	100 U/mL以上	100.0 U/mL以上
P.78	1597	風疹ウイルス抗体 血清【HI法】	検体量	血清 0.2mL	血清 0.3mL
			所要日数	5～7日	2～4日
			最大報告値	67108864倍	2048倍以上
P.85	0891	HBs抗原定性	項目名称	HBs抗原	HBs抗原定性
			検体量	血清 0.2mL	血清 0.3mL
			所要日数	4～6日	2～3日
			基準値・単位	陰性(8未満)・倍	(-)
			報告形態	陰性、8倍、16倍、32倍・・・ ※結果が8倍未満の場合は「陰性」、 8倍からは倍々希釈の数値で報告	(-)、(±)、(+)
			最大報告値	512倍以上	
P.85・P.129	6679	HBV-DNA定量 アクジゲン	保存条件	必凍	凍結
			所要日数	5～6日	3～7日
			報告形態	7233： 増幅反応シグナル併記用コード (検出)又は(検出せず) JLAC10： 5F015-1441-022-862-11	
	7029	HBV-DNA定量 TaqManPCR	保存条件	必凍	凍結
			所要日数	5～6日	2～6日
7062	HCV-RNA定量 アクジゲン	保存条件	必凍	凍結	
		所要日数	5～6日	2～4日	
7062	HCV-RNA定量 アクジゲン	最小報告値	1.0 LogU/mL未満	1.3 LogU/mL未満	
		最大報告値	9.0 LogU/mL以上	設定なし	
P.87・P.129	7062	HCV-RNA定量 アクジゲン	報告形態	7368： 増幅反応シグナル併記用コード (検出)又は(検出せず) JLAC10： 5F015-1441-023-862-11	
			報告形態	7497： 増幅反応シグナル併記用コード (検出)又は(検出せず) JLAC10： 5F360-1453-023-875-11	

## ● 受託再開に伴う検査内容変更

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.87・P.129	6975	HCV-RNA定量 TaqManPCR	保存条件	必凍	凍結
			所要日数	5～6日	2～6日
			最大報告値	8.0 LogIU/mL以上	設定なし
			報告形態	7369： 増幅反応シグナル併記用コード (検出)又は(検出せず) JLAC10： 5F360-1453-023-875-11	
P.89	0189	可溶性IL-2受容体 (可溶性インターロイキン-2レセプター)	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
			所要日数	4～5日	2～4日
			基準値	121～613 U/mL	145～519 U/mL
			最小報告値	50 U/mL未満	50 U/mL以下
			最大報告値	400000 U/mL以上	設定なし
P.128	7243	HPV-DNA 16型、18型、他ハイリスク型	保存条件	冷蔵	室温
			所要日数	5～6日	2～6日
	9339	HPV-DNA ハイリスク型HC	保存条件	冷蔵	室温
			所要日数	5～6日	4～8日

## ● 受託再開項目

総合検査案内	検査コード	検査項目名称
P.36	7949	胃がんリスク検診(ABC検診)
P.124	7263	HPV定性 *細胞診の結果(ASCUS)に基づいて実施
	7261	HPV定性 *細胞診の結果に関係なく実施