

平成31年3月

先生各位

検査受託再開および変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび総合研究所で発生しました火災以降、受託を一時中断させていただいておりました添付一覧の項目について、受託の再開および検査内容の変更をさせていただきますのでご案内申し上げます。

ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《受託再開日》 平成31年3月11日（月）受付分より

《再開項目》 添付一覧をご参照ください。

《注 意》 平成31年3月9日（土）受付以前の追加検査はお受けできませんので、予めご了承願います。

添付：受託再開および検査内容変更一覧

● 受託再開に伴う検査内容変更

| 総合検査案内 | 検査コード | 検査項目名称 | 変更内容 | 変更後 | 変更前 |
|--------|-------|------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| P.4 | 0144 | CK-MB (CPK-MB) 【免疫阻害法】 | 検体量 | 血清 0.5mL | 血清 0.6mL |
| | | | 保存条件 | 必凍 | 凍結 |
| | | | 所要日数 | 4～6日 | 1～3日 |
| | | | 検査方法 | 免疫阻止-UV法 | 免疫阻害法 |
| | | | 最小報告値 | 3 U/L未満 | 2 U/L以下 |
| P.4 | 0172 | グアナーゼ | 検体量 | 血清 0.5mL | 血清 0.6mL |
| | | | 所要日数 | 4～5日 | 1～3日 |
| | | | 基準値 | 0.4～1.1 U/L | 1.4 U/L以下 |
| | | | 最小報告値 | 0.1 U/L以下 | 0.3 U/L |
| P.5 | 0427 | クレアチン 血清 | 検体量 | 血清 0.5mL | 血清 0.6mL |
| | | | 所要日数 | 4～5日 | 1～3日 |
| | | | 基準値 | 0.3～1.2 mg/dL | 男：0.17～0.50 女：0.35～0.93 mg/dL |
| | | | 報告形態 | 小数点第一位 | 小数点第二位 |
| | | | 最小報告値 | 0.1 mg/dL以下 | 0.02 mg/dL |
| P.5 | 0436 | クレアチン 尿 | 検体量 | 蓄尿 5.0mL | 蓄尿 1.0mL |
| | | | 所要日数 | 4～6日 | 1～3日 |
| | | | 基準値 | 男：0.20以下 女：0.43以下 g/day | 男：150以下 女：250以下 mg/day |
| | | | 報告形態 | 小数点第二位 | 整数 |
| | | | 最小報告値 (部分尿) | 0.50 mg/dL以下 | 設定なし |
| P.25 | 0703 | プリミドン 【薬物分析検査】 | 検体量 | 血清 0.3mL | 血清 0.6mL |
| | | | 所要日数 | 4～5日 | 1～3日 |
| | | | 検査方法 | EMIT法 | EIA法 |
| | | | 最小報告値 | 2.5 μg/mL未満 | 2.5 μg/mL以下 |
| P.25 | 0705 | エトスクシミド 【薬物分析検査】 | 検体量 | 血清 0.4mL | 血清 0.6mL |
| | | | 所要日数 | 4～5日 | 1～3日 |
| | | | 有効治療 濃度 | 40～100 μg/mL | 40.0～100.0 μg/mL |
| | | | 報告形態 | 整数 | 小数点第一位 |
| | | | 最小報告値 | 1 μg/mL未満 | 10.0 μg/mL以下 |
| P.45 | 1207 | α1-アンチトリプシン (α1-AT) | 検体量 | 血清 0.5mL | 血清 0.6mL |
| | | | 所要日数 | 4～5日 | 1～3日 |
| | | | 検査方法 | ネフェロメトリー法 | TIA法 |
| | | | JLAC10 | 5C020-0000-023-063-01 | 5C020-0000-023-061-01 |
| | | | 最小報告値 | 1 mg/dL未満 | 1 mg/dL |
| P.46 | 1223 | α1-マイクログロブリン (α1MG) 尿 | 所要日数 | 4～5日 | 1～3日 |
| | | | 基準値 | 8.3 mg/L以下 | 随時尿 男：0.8～14.1 女：0.5～7.0 mg/L |
| | | | 最小報告値 | 0.4 mg/L未満 | 0.4 mg/L以下 |

| 総合検査案内 | 検査コード | 検査項目名称 | 変更内容 | 変更後 | 変更前 |
|--------|-------|-------------------------------|-------|---|-------------------------------------|
| P.48 | 1354 | 抗セントロメア抗体 【FEIA法】 | 所要日数 | 4～5日 | 2～4日 |
| | | | 基準値 | 7.0 U/mL未満 陰性 | 7 U/mL未満 陰性 |
| | | | 報告形態 | 小数点第一位 | 整数 |
| | | | 最小報告値 | 0.5 U/mL未満 | 1 U/mL以下 |
| | | | 最大報告値 | 240.0 U/mL以上 | 240 U/mL以上 |
| | | | 判定基準 | 陰性 7.0未満 疑陽性 7.0～10.0以下 陽性 10.0を超える U/mL | 陰性 <7 疑陽性 7～10 陽性 >10 U/mL |
| P.75 | 6944 | EBウイルス抗体（EBV）抗VCA-IgG 【EIA法】 | 検体量 | 血清 0.2mL | 血清 0.3mL |
| | | | 所要日数 | 4～6日 | 2～5日 |
| | | | 最小報告値 | 0.0 | 0.5未満 |
| | | | 最大報告値 | 99.9 | 20.0以上 |
| P.75 | 6946 | EBウイルス抗体（EBV）抗VCA-IgM 【EIA法】 | 検体量 | 血清 0.2mL | 血清 0.3mL |
| | | | 所要日数 | 4～6日 | 2～5日 |
| | | | 最小報告値 | 0.0 | 0.5未満 |
| | | | 最大報告値 | 99.9 | 20.0以上 |
| P.75 | 6948 | EBウイルス抗体（EBV）抗EBNA-IgG 【EIA法】 | 検体量 | 血清 0.2mL | 血清 0.3mL |
| | | | 所要日数 | 4～6日 | 2～5日 |
| | | | 最小報告値 | 0.0 | 0.5未満 |
| | | | 最大報告値 | 99.9 | 20.0以上 |
| 未掲載 | 0069 | m-GOT（ミトコンドリア-GOT）血清 | 検体量 | 血清 0.5mL | 血清 0.6mL |
| | | | 所要日数 | 4～5日 | 1～3日 |
| | | | 最小報告値 | 0 U/L | 1 U/L |

● 受託再開

| 総合検査案内 | 検査コード | 検査項目名称 |
|------------|-------------------|-----------------------------|
| P.4 | 0215 | CK-MB（CPK-MB） 【ECLIA法】 |
| P.4 | 0156 | リゾチーム 尿 |
| P.36 | 2411 | C-ヘプチド（CPR） 尿 |
| P.42・P.103 | 3235 | 鼻汁好酸球 |
| P.92 | 6001 | フリーPSA／トータルPSA比 |
| P.98 | 1989 | FDP 血漿 |
| P.98 | 1993 | アンチトロンビン活性（AT） |
| P.108 | 3471 | マイコプラズマ培養 |
| 未掲載 | 4527 | C-ヘプチド（CPR） 尿 ※顧客限定 |
| | 5631～ 5635 | 耐糖能精密検査 C-ヘプチド（CPR） 尿 ※顧客限定 |
| | 6022～6024 6756 | 耐糖能精密検査 C-ヘプチド（CPR） 尿 ※顧客限定 |
| | 1213 | アポリポ蛋白比 B/A I |
| | 4337 | アルミニウム（Al） 透析液 |