

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記項目の検査内容を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《変更日》 平成15年7月3日(月)受付分より

《変更内容》

2002年 検査案内	検査 コード	検査項目名称	変更内容	
P.30 P.78	4382	型コラーゲン架橋 N-テロペプチド(NTx) (尿)	基準値 (参考値) 判定基準	下表参照

《変更理由》 日本骨粗鬆症学会「骨粗鬆症診療における骨代謝マーカーの適正使用ガイドライン(2002年度版)」に基づく基準値(参考値)、判定基準の再設定

	変更後	変更前
基準値 (参考値)	女性閉経前(30~44歳) 9.3~54.3 閉経後(45~79歳) 14.3~89.0 男性(45~59歳) 13.0~66.2 nmolBCE/mmol・CRE	女性閉経前(19~56歳) 8.3~69.9 閉経後(39~80歳) 14.0~99.5 男性(20~78歳) 13.0~73.0 nmolBCE/mmol・CRE
判定基準	骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択及び薬剤効果 判定の指標 35.3以上 nmolBCE/mmol・CRE	骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択及び薬剤効果 判定の指標 41以上 nmolBCE/mmol・CRE

その他の検査要項に変更はございません。